

施設名:

未就学児用 食物アレルギー・アナフィラキシー 生活管理指導表

提出日 年 月 日

児氏名() 【男・女】 年 月 日生 (歳 ヶ月) 組名()

★施設における日常の取り組み及び緊急時の対応に活用するため、本表に記載された内容を施設の職員及び消防機関・医療機関等と共有することに、同意します。

保護者氏名()

緊急連絡先 *連絡医療機関は、主治医と相談のうえで記載してください。(「救急車要請」と記載することも可。)

★ 第1連絡者 氏名 電話 続柄() 第2連絡者 氏名 電話 続柄()

★ 医療機関名 名称 電話

※ 以下は主治医（医療機関）におかれまして、現在の状況及び今後1年間を通じて予測される状況等の記載をお願いします。

主治医氏名 () 医療機関の名称() 記載日 年 月 日

病型・治療	施設での生活上の留意点
<p>A.食物アレルギー病型</p> <p>1.食物アレルギーの関与する乳児アトピー性皮膚炎</p> <p>2.即時型</p> <p>3.その他（新生児・乳児消化管アレルギー・口腔アレルギー症候群・食物依存性運動誘発アナフィラキシー・その他：)</p>	<p>A.給食・離乳食（おやつを含む）</p> <p>1.管理不要</p> <p>2.管理必要(管理内容については病型・治療のC.欄及び下記C.E欄を参照)</p>
<p>B.アナフィラキシー病型(アナフィラキシーの既往ありの場合のみ記載してください。)</p> <p>1.食物 (原因：)</p> <p>2.その他 (医薬品・食物依存性運動誘発アナフィラキシー・ラテックスアレルギー・)</p>	<p>B.アレルギー用調整粉乳</p> <p>1.不要</p> <p>2.必要 *該当ミルク名()</p>
<p>C.原因食物・除去根拠</p> <p>該当する食品の番号に○をし、除去の根拠を下記より選択し①～④の該当する全ての番号を()に記載してください。また8～15については、《 》内にも記載をしてください。</p> <p>①明らかな症状の既往 ②食物負荷試験陽性 ③IgE抗体等検査結果陽性 ④未摂取</p> <p>1.鶏卵 () 2.牛乳・乳製品 () 3.小麦 () 4.ソバ ()</p> <p>5.ピーナッツ() 6.大豆 () 7.ゴマ ()</p> <p>8.ナッツ類 () 《 すべて・クルミ・カシューナッツ・アーモンド・ 》</p> <p>9.甲殻類 () 《 すべて・エビ・カニ・ 》</p> <p>10.軟体類・貝類 () 《 すべて・イカ・タコ・ホタテ・アサリ・ 》</p> <p>11.魚卵 () 《 すべて・イクラ・タラコ・ 》</p> <p>12.魚類 () 《 すべて・サバ・サケ・ 》</p> <p>13.肉類 () 《 鶏肉・牛肉・豚肉・ 》</p> <p>14.果物類 () 《 キウイ・バナナ・ 》</p> <p>15.その他 () 《 》</p>	<p>C.除去食品で摂取不可能なもの</p> <p>「病型・治療」のCで除去の際に摂取不可能なものに○</p> <p>1. 卵殻カルシウム（鶏卵）</p> <p>2. 乳糖（牛乳・乳製品）</p> <p>3. 醤油・酢・麦茶（小麦）</p> <p>6. 大豆油・醤油・味噌（大豆）</p> <p>7. ゴマ油（ゴマ）</p> <p>12. かつおだし・いりこだし（魚類）</p> <p>13. エキス（肉類）</p> <p>D.食物・食材を扱う活動</p> <p>1.管理不要</p> <p>2.原因食材を教材とする活動の制限()</p> <p>3.調理活動時の制限()</p> <p>4.その他 ()</p>
<p>D. 緊急時に備えた処方薬</p> <p>1.内服薬(抗ヒスタミン薬・ステロイド薬) 2.アドレナリン自己注射薬「エピペン®」</p> <p>3.その他 ()</p>	<p>E.その他の配慮・管理事項</p>

※本欄に○がついた場合、該当する食品を使用した料理については、給食対応が困難となる場合があります。

※管理指導表は症状等に変化がない場合であっても、配慮や管理が必要な間は、少なくとも毎年提出してください。

参考

※厚生労働省発行「保育所におけるアレルギー対応ガイドライン」P.37抜粋

【症状チェックシート】

◆迷ったらエピペン[®]を使用する
 ◆症状は急激に変化する可能性がある
 ◆少なくとも5分ごとに症状を注意深く観察する
 ◆の症状が1つでも当てはまる場合、エピペン[®]を使用する
 (内服薬を飲んだ後にエピペン[®]を使用しても問題ない)

◆症状のチェックは緊急性が高い、左の欄から行う (→ →)

全身の 症状	<input type="checkbox"/> ぐったり <input type="checkbox"/> 意識もうろう <input type="checkbox"/> 尿や便を漏らす <input type="checkbox"/> 脈が触れにくいまたは不規則 <input type="checkbox"/> 唇や爪が青白い		
呼吸器 の症状	<input type="checkbox"/> のどや胸が締め付けられる <input type="checkbox"/> 声がかすれる <input type="checkbox"/> 犬が吠えるような咳 <input type="checkbox"/> 息がしにくい <input type="checkbox"/> 持続する強い咳き込み <input type="checkbox"/> ゼーゼーする呼吸	<input type="checkbox"/> 数回の軽い咳	
消化器 の症状	<input type="checkbox"/> 持続する強い(がまんできない) お腹の痛み <input type="checkbox"/> 繰り返して吐き続ける	<input type="checkbox"/> 中等度のお腹の痛み <input type="checkbox"/> 1～2回の嘔吐 <input type="checkbox"/> 1～2回の下痢	<input type="checkbox"/> 軽い(がまんできる)お腹の痛み <input type="checkbox"/> 吐き気
目・口・ 鼻・顔 の症状	<input type="checkbox"/> 顔全体の腫れ <input type="checkbox"/> まぶたの腫れ	<input type="checkbox"/> 目のかゆみ、充血 <input type="checkbox"/> 口の中の違和感、唇の腫れ <input type="checkbox"/> くしゃみ、鼻水、鼻づまり	
皮膚の 症状	上記の症状が 1つでも当てはまる場合		
	<input type="checkbox"/> 強いかゆみ <input type="checkbox"/> 全身に広がるじんま疹 <input type="checkbox"/> 全身が真っ赤	<input type="checkbox"/> 軽度のかゆみ <input type="checkbox"/> 数個のじんま疹 <input type="checkbox"/> 部分的な赤み	
	1つでも当てはまる場合	1つでも当てはまる場合	

①ただちにエピペン[®]を使用
 ②救急車を要請(119番)
 ③その場で安静を保つ
 ④その場で救急隊を待つ
 ⑤可能なら内服薬を飲ませる
 ()

**ただちに救急車で
医療機関へ搬送**

①内服薬を飲ませ、エピペン[®]
を準備
()

②速やかに医療機関を受診
(救急車の要請も考慮)
()

③医療機関に到着するまで
少なくとも5分ごとに症状
の変化を観察。の症状
が1つでも当てはまる場合、
エピペン[®]を使用。

**速やかに
医療機関を受診**

①内服薬を飲ませる
()
()

②少なくとも1時間は、5分ご
とに症状の変化を観察し、
症状の改善がみられない場
合は医療機関を受診
()

**安静にし
注意深く経過観察**